


Schémas préventifs

- **Soit en continu** : 1 comprimé de Tenofovir/Emtricitabine par 24 heures (optimal après 7 jours)
- **Soit à la demande ou « intermittent »** encadrant les rapports sexuels, selon le schéma suivant (validé à ce jour uniquement chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes). Le traitement doit être poursuivi jusqu'à deux jours après le dernier rapport sexuel.



Y penser ...

- **Traitement post-exposition** s'il y a risque avéré datant de moins de 48 heures (en l'absence de PrEP)
- Mise à jour du **calendrier vaccinal** (hépatites A et B, papillomavirus et méningocoque)
- Dépistage et traitement des IST

Liens utiles

- www.ansm.sante.fr
- www.cns.sante.fr
- www.has-sante.fr
- www.aides.org
- Www.prep-info.fr
- www.sexosafe.fr
- www.vihcliv.fr
- www.hiv-druginteractions.org
- Sida info service 0800 840 800

Où trouver la PrEP en Bourgogne Franche-Comté ?

COTE D'OR

CeGIDD DIJON
CHU de Dijon
Bd de Lattre de Tassigny
(bâtiment à gauche des urgences
adultes 1^{er} étage)
21000 Dijon
Tél. 03 80 28 14 63

NIEVRE

CeGIDD NEVERS
3 bis rue Lamartine
58000 Nevers
Tél. 0 800 58 00 00

SAÔNE-ET-LOIRE

CeGIDD MÂCON
Hôpital de Mâcon
Centre ambulatoire
350 Bd Louis Escande
71000 Mâcon
Tél. 03 85 27 72 39
CeGIDD CHALON-SUR-SAÔNE
CH William Morey
4 rue Capitaine Drillien
71321 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 91 00 57
CH MÂCON

Service médecine interne et
infectiologie
350 Bd Louis Escande
71018 Mâcon Cedex 71
Secrétariat infectiologie
Tél. 03 85 27 53 33
CH PARAY-LE-MONIAL
Service infectiologie
Boulevard des Charmes
71600 Paray-le-Monial
Secrétariat Infectiologie
Tél. 03 85 81 85 44

YONNE

CeGIDD SENS
CH de Sens - site Saint-Jean
7 Bd du Maréchal Foch
89 108 SENS Cedex
Tél. 03 86 86 18 89
CH DE SENS
1 avenue Pierre de Coubertin
89 108 Sens Cedex

TERRITOIRE DE BELFORT

CeGIDD BELFORT
Parc technologique
14b rue des Entrepreneurs
90000 Belfort
Tél. 03 84 28 17 12
HNFC SITE DE TREVENANS
Service infectiologie
90400 Belfort Cedex
Tél. 03 84 98 22 00

HAUTE-SAÔNE

CeGIDD VESOUL
CHI de Haute-Saône
2 rue René Heymès
70000 Vesoul
Tél. 03 84 96 61 23

JURA

CeGIDD LONS-LE-SAUNIER
CH Lons-le-Saunier
55 rue du Docteur Jean Michel
39000 Lons-Le-Saunier
Tél. 03 84 35 62 06
CeGIDD DOLE
CH Louis Pasteur
Avenue Léon Jouhaux
39100 Dole
Tél. 03 84 79 80 77

DOUBS

CeGIDD BESANÇON
15 avenue Denfert Rochereau
25000 Besançon
Tél. 03 81 65 44 50
CeGIDD MONTBELIARD
40 Faubourg de Besançon
25000 Besançon
Tél. 03 81 99 37 00
CHU DE BESANÇON J. MINJOZ
3 bd Alexandre Fleming
25000 Besançon
Service Maladies Infectieuses
Tél. 03 81 21 85 33
Service Dermatologie
Tél. 03 81 21 84 65



Traitement préventif pré-exposition VIH PrEP VIH



C'est quoi ?

Une nouvelle stratégie de prévention du VIH qui consiste à prendre des médicaments actifs contre le VIH (Tenofovir/Emtricitabine).

Pour qui ?

La PrEP est recommandée pour les individus très exposés à l'infection par le VIH.

Par qui ?

Un médecin expérimenté dans la prise en charge du VIH ou un médecin de CeGIDD (Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des IST/VIH) pour la primo-prescription. Le suivi ultérieur peut être réalisé par le médecin traitant.

COREVIH Bourgogne-Franche-Comté
Centre hospitalier universitaire,
Hôpital Jean Minjoz 3 boulevard Fleming 25 030 Besançon Cedex
Tél. 03 81 21 80 98 - corevih@chu-besancon.fr
<https://www.docvadis.fr/corevih-bourgogne-franche-comte/le-corevih/>

POUR QUI ?

Homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ou personnes transgenres ET au moins l'un des critères ci-dessous :

☀ ayant plusieurs partenaires et/ou antécédents d'IST, de recours au traitement post-exposition (TPE), de consommation de drogues pendant les rapports sexuels.

Homme ou femme en situation à haut risque d'acquisition de l'infection par le VIH chez lequel/laquelle une PrEP peut être envisagée au cas par cas :

- Usagers de drogues injectables avec partage de seringues,
- Travailleurs du sexe exposés à des rapports non protégés,
- Personnes en situation de vulnérabilité, exposées à des rapports non protégés.

CONTRE-INDICATIONS

- ☀ Séropositivité au VIH ou sérologie VIH inconnue;
- ☀ Présence de signes ou symptômes d'infection aiguë par le VIH (primo-infection),
- ☀ Troubles rénaux caractérisés par une clairance de la créatinine <60 ml/min ou signes de tubulopathie;
- ☀ Allaitement,
- ☀ Hypersensibilité à l'un des principes actifs ou des excipients du produit.

RECOMMANDATION

! **Le préservatif reste l'outil le plus efficace pour prévenir à la fois l'infection par le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles.**

ATTENTION

S'assurer que le patient n'est pas en situation de primo-infection :

Les signes évocateurs d'une infection récente sont fatigue, fièvre, douleurs articulaires ou courbatures, maux de tête, vomissements ou diarrhées, éruption cutanée, sueurs nocturnes, adénopathies.

VIH et IST : dépistage tous les 3 mois
Ne pas oublier l'accompagnement en santé sexuelle

Mise à jour du calendrier vaccinal



S'assurer que le patient n'est pas dans un besoin de traitement de post-exposition

Attention aux médicaments néphrotoxiques associés et aux interactions

Attention : la PrEP est un outil de prévention complémentaire à l'utilisation du préservatif, > la PrEP ne protège que du VIH, le préservatif reste essentiel

COMMENT ?

1^{re} consultation

Si la personne est en possession d'un bilan et d'un carnet de vaccination, les apporter à la consultation. Attendre les résultats de la sérologie VIH avant la prescription.

2^e consultation

Une deuxième consultation 4 semaines plus tard doit permettre de vérifier la tolérance de la PrEP, la compréhension du schéma médicamenteux utilisé et surtout vérifier par une sérologie VIH que le patient n'était pas en primo-infection au moment de la prescription initiale. A l'issue de la deuxième consultation, le praticien établira l'ordonnance de tenofovirDF/Emtricitabine pour les trois mois suivants.

>> Suivi tous les 3 mois minimum

Examens	Avant initiation de la PrEP	M1	Tous les 3 mois
☀ Créatinémie et clairance de la créatinine	☉	☉	☉
☀ Phosphorémie	☉	☉	☉
☀ Sérologie VIH	☉	☉	☉
☀ Sérologies VHB, VHA, VHC	☉		(fonction des résultats de J0 et des vaccinations mises à jour)
☀ Dépistage des IST*et sérologie syphilis	☉		☉
☀ BHCG	☉		☉

*PCR Chlamydia, gonocoque multi-sites (gorge, urines, anus, vagin)